

MICOTERBIN

Terbinafina Clorhidrato 1%

Crema

Antimicótico

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

Contenido del Inserto:

1. ¿Qué es Micoterbin 1% Crema y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Micoterbin 1% Crema?
3. ¿Cómo usar Micoterbin 1% Crema?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Micoterbin 1% Crema
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Micoterbin 1% crema y para qué se utiliza?

La terbinafina es un fármaco antifúngico, que pertenece al grupo de las alilaminas, que actúa impidiendo el crecimiento de los hongos.

Este medicamento está indicado en el tratamiento de la tinea pedis o pie de atleta en adultos, infección dérmica superficial causada por hongos y localizada entre los dedos de los pies.

Los principales síntomas son: picor, enrojecimiento (eritema), grietas entre los dedos y descamación, pudiendo llegar a inflamación o pústulas.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días de tratamiento.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Micoterbin 1% Crema?

No use Micoterbin 1% Crema

Si es alérgico a la terbinafina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

- Este medicamento es sólo para uso sobre la piel y exclusivamente para el pie de atleta. Puede ser irritante para los ojos, por lo que debe evitarse el contacto con éstos. En caso de contacto accidental, deben lavarse a fondo con agua del grifo.
- Si tras la administración presenta alguna reacción en la zona tratada, es posible que deba interrumpir el tratamiento. Consulte a su médico si éste fuese el caso.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Micoterbin 1% Crema.

Niños y adolescentes:

La experiencia de uso de terbinafina en niños es limitada, por lo que no se recomienda su utilización en menores de 18 años.

Uso de Micoterbin 1% Crema con otros medicamentos:

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente, o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

No se recomienda el uso al mismo tiempo de otros productos en las zonas donde se aplique la crema de terbinafina.

Embarazo, lactancia y fertilidad:

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. Este medicamento no deberá utilizarse durante el embarazo a menos que esté claramente indicado.

No use este medicamento si está dando el pecho, ya que la terbinafina pasa a la leche materna.

Conducción y uso de máquinas:

No se ha descrito ningún efecto en este sentido.

Micoterbin 1% Crema contiene alcohol cetílico y alcohol estearílico.

Este medicamento puede provocar reacciones locales en la piel (por ejemplo, dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetílico y alcohol estearílico

3. ¿Cómo usar Micoterbin 1% Crema?

Este medicamento se debe utilizar exclusivamente sobre la piel de la zona afectada de los pies.

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada en mayores de 18 años es: una o dos aplicaciones al día, durante 7 días.

- Antes de aplicar la crema, limpie y seque las áreas afectadas cuidadosamente. Aplique una capa fina de crema sobre la piel afectada entre los dedos de los pies, y de un ligero masaje hasta su completa absorción.
- Recuerde usar su medicamento.
- Se aconseja utilizar zapatos bien ventilados, evitar zapatos y suelas de goma, evitar calcetines de fibra y cambiarse los calcetines con cada aplicación debido a la posibilidad de reinfectarse. Para evitar contagios, no se deben compartir toallas, calcetines ni calzado con otras personas ni se debe andar descalzo en piscinas, vestuarios y baños colectivos.
- Si a los 7 días de su utilización no observa una mejoría de sus síntomas consulte con su médico.
- Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

Si usa más Micoterbin 1% crema del que debe:

Si usted ha usado más crema de lo que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica.

Si olvidó usar Micoterbin 1% crema

Si olvidó aplicar la crema, aplíquela tan pronto como lo recuerde, aunque si queda poco para la siguiente aplicación, conviene esperar hasta entonces. En ningún momento debe utilizar doble cantidad de crema para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Micoterbin 1% Crema

No interrumpa el tratamiento con Micoterbin 1% Crema antes de 7 días, ya que es posible que la infección reaparezca.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos poco frecuentes (que afectan entre 1 y 10 de cada 1000 personas) son: irritación o sensación de quemazón en el lugar de aplicación.

Los efectos adversos muy raros (afectan a menos de 1 por cada 10.000 personas) se dan en la piel y en el tejido por debajo de ésta y son: reacciones alérgicas, picor, urticaria y aparición de ampollas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este inserto, informe a su médico o farmacéutico.

5. Conservación de Micoterbin 1% Crema

Almacenar a temperatura no mayor de 30 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como desechar los envases y medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Micoterbin 1% Crema:

Cada 100g de crema contiene:

Terbinafina Clorhidrato.....1g

Excipientes c.s.p.

- Los demás componentes (excipientes) son: Macrogol Cetoestearílico éter (cetareth-6 y alcohol estearílico), Macrogol Cetoestearílico éter (Cetareth-25), Alcohol Cetílico, Propilparabeno, Propilenglicol, Aceite mineral, PEG-100 Estearato y Estearato de Glicerilo, Alcohol Isopropílico, Cetearil Etilhexanoato, Polietilenglicol 6 000, Agua Purificada

Aspecto del producto y contenido del envase:

Crema de color blanco, de aspecto uniforme, libre de partículas extrañas.

Se presenta en envase conteniendo 20 gramos de crema.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

INTIPHARMA S.A.C

Calle Bolívar N°270 Of. 701 – Miraflores

Lima - Perú