

INSERTO
ALIVOS-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal
Bencidamina clorhidrato

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

Contenido del inserto

1. Que es Bencidamina clorhidrato y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bencidamina clorhidrato
3. Cómo usar Bencidamina clorhidrato
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Bencidamina clorhidrato
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal y para qué se utiliza

Bencidamina clorhidrato contiene el principio activo bencidamina clorhidrato y pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Funciona al detener el dolor y la hinchazón (inflamación).

Bencidamina clorhidrato está indicado para el alivio local sintomático del dolor y de las irritaciones de la garganta y de la boca en adultos.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal

No use Bencidamina Clorhidrato

- Si es alérgico a bencidamina clorhidrato o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Bencidamina clorhidrato.

- Si usted presenta alergia a los salicilatos (por ejemplo, ácido acetilsalicílico y ácido salicílico) o a otros medicamentos para la fiebre, dolor e inflamación (denominados AINE).
- Si usted sufre o ha sufrido alguna vez de asma bronquial o enfermedades alérgicas, ya que tiene un mayor riesgo de desarrollar broncospasmo o alergia.

Si aparece una reacción alérgica, usted debe dejar de usar este medicamento y contactar con un médico o una unidad de emergencia.

La aparición de úlceras en la boca y en la faringe pueden ser síntomas de patologías más graves.

Si sus síntomas, debe contactar con un médico.

El uso prolongado de este medicamento puede ser perjudicial para la flora bacteriana bucal y puede causar sensibilización, en cuyo caso puede ser necesario suspender temporalmente su uso y consultar al médico.

La duración del tratamiento no debe exceder los 7 días.

Evite el contacto del medicamento con los ojos.

No es apto para **adolescentes y niños**.

Otros medicamentos y Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Bencidamina clorhidrato no debe usarse durante el embarazo o lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Bencidamina clorhidrato tiene un efecto nulo o despreciable en la capacidad para conducir y usar máquinas.

Este medicamento contiene glicerina. Bencidamina clorhidrato solución para pulverización bucal contiene sodio.

Este medicamento contiene aceite de ricino hidrogenado polioxilado. Puede causar molestias estomacales y diarrea.

Este medicamento contiene saborizante de menta que puede causar reacciones alérgicas.

3. Cómo usar Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Bencidamina clorhidrato está indicado para su aplicación en la garganta o en la boca.

No exceder la dosis recomendada. El tratamiento continuado no debe exceder los 7 días.

La dosis recomendada es:

Adultos:


Aplicar de 2 a 4 pulverizaciones cada vez, de 2 a 6 veces por día (no más de cada 1,5 – 3 horas).

Pacientes de edad avanzada


A menos de que el dentista o el médico prescriban dosis diferentes, se aplicarán las dosis indicadas para adultos.

Instrucciones de uso:

1. Levantar la cánula de pulverización



2. Introducir la cánula en la boca y dirigir el spray hacia la zona inflamada. Presionar uniformemente con el dedo sobre la zona que sobresale.



En el primer uso de Bencidamina clorhidrato, apretar el pulsador varias veces al vacío hasta obtener una pulverización uniforme.

Durante la pulverización, usted debe contener la respiración.

Este medicamento no debe usarse inmediatamente antes de comer o beber.

Usted debe contactar con un médico si no se encuentra mejor o si se encuentra peor después de 3 días.

Si usa más Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal del que debe

Si usted usa demasiado o si accidentalmente traga grandes cantidades de Bencidamina clorhidrato, debe contactar inmediatamente con su médico o farmacéutico para que le aconseje.

En caso de sobredosis, inducir el vómito puede servir como una primera medida.

Si olvidó usar Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Poco frecuentes (pueden afectar a 1 de cada 100 pacientes):

Fotosensibilidad (la piel se vuelve más sensible a la luz solar que lo normal, causando una erupción con picazón, enrojecida y escamosa, a veces con ampollas)

Raros (pueden afectar a 1 de cada 1000 pacientes):

Escozor y sequedad de boca

Boca y faringe entumecida (este efecto forma parte del objeto de la medicación y desaparece rápidamente)

Náusea
Vómitos

Muy raros (pueden afectar a 1 de cada 10.000 pacientes):

Dificultad para respirar o tragar (laringospasmo o broncospasmo)
Inflamación dolorosa de la membrana mucosa subcutánea (angioedema)

Desconocida

- Reacciones alérgicas (Hipersensibilidad)
- Si usted experimenta alguno de los efectos adversos listados a continuación, debe solicitar ayuda médica inmediatamente.

Reacción alérgica grave (shock anafiláctico), signos como dificultad respiratoria, dolor u opresión en el pecho y/o sensación de mareo/desmayo, picor grave de la piel o aparición de bultos en la piel, inflamación de la cara, labios, lengua y/o garganta, los cuales ser potencialmente peligrosos para la vida.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. Se les pide a los profesionales sanitarios y a los pacientes usuarios reportar cualquier sospecha de reacción adversa al correo electrónico: farmacovigilancia@intipharma.com, Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el envase después de caducidad. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Tras la primera apertura, almacenar a temperatura no mayor de 30°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de **Alivoz-B 3mg/mL Solución para Pulverización Bucal**

- El principio activo es bencidamina clorhidrato.
Los demás componentes son: Alcohol etílico, glicerina, aceite de ricino hidrogenado polioxilado 40, metilparabeno, sacarina sódica, saborizante menta NF M74643-05, Agua purificada.

7. Titular de la autorización de comercialización

INTIPHARMA S.A.C.
RUC 20428837780
Calle Bolívar 270 Of. 701, Miraflores
Lima – Perú